

Tab. 2 - Principali effetti collaterali degli antiinfiammatori non steroidei

1 - Tossicità gastro-intestinale

Irritazione gastrica, dispepsia, ulcere peptiche, ematemesi, diarrea.

2 - Tossicità ematologica:

Leucopenia, inibizione dell'aggregabilità piastrinica, allungamento del tempo di sanguinamento, diminuzione del tempo di sopravvivenza degli eritrociti, agranulocitosi, anemia aplastica. L'incidenza di tali effetti con i FANS è rara ma sono fra le principali cause di morte attribuite a tali farmaci.

3 - Tossicità renale:

Ritenzione idrica, ridotta escrezione del sodio, iperazotemia, iperpotassiemia, oliguria, nefrite acuta interstiziale, necrosi papillare acuta, anuria. Tutti i FANS possono produrre tali effetti, in quanto viene inibita la sintesi delle prostaglandine le quali favoriscono il flusso ematico renale, la filtrazione glomerulare e l'escrezione renale di acqua e sodio.


4 - Tossicità epatica:

Aumento delle transaminasi, epatite colostatica, epatite granulomatosa, necrosi epatica, epatite cronica.

5 - Altri effetti collaterali:

Dermatiti, cefalea, acufeni, reazioni allergiche, broncospasmo, insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco congestizio.

G. P. VELO - VR



DOLORE CRONICO → DOLORE INASCOLTATO

È un dolore che PERMANE Anche quando
LA MALATTIA È GUARITA.

- Dolore NOCICETTIVO cronico, Prodotto da Flogosi
cronica con sensibilizzazione dei ~~recettori~~
Nociceptori con aumento di risposta
agli stimoli ALGICI. termici, meccanici, chimici

- Dolore cronico NEUROPATICO, dalla sensibilizzazione
dei recettori locali, L₁ e L₂, alla IPERSENSIBILIZZAZIONE
dei neuroni spinali, e sovrastimoli cronici
di perenne dolore spontaneo - e persistente.
Neuralgia post-herpetica, neuropatia diabetica.