

OSPEDALE MAGGIORE B.GO TRENTO
SERVIZIO AUTONOMO DI TERAPIA ANTALGICA

Primario: Prof. G.L.Fanchiotti

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SULLE
cefalee essenziali
BASATA SULLA FREQUENZA E SU
CRITERI DESCRITTI DAL MEDICO DI
B A S E

PRIMA INDAGINE

- pazienti cefalalgici accertati n. _____
- pazienti cefalalgici che consultano il medico di base n. _____
- in quale frequenza: settimanale
mensile
annua

SESSO : maschile n. _____
in età evolutiva n. _____
in età adulta n. _____

femminile n. _____
in età evolutiva n. _____
in età adulta n. _____

PROFESSIONE :

liberi professionisti n. _____
dirigenti n. _____
impiegati n. _____
studenti n. _____
operai n. _____
casalinghe n. _____
pensionati n. _____

PAZIENTI A PREDISPOSIZIONE CEFALALGICA :

familiarità maschi n. _____ femmine n. _____

presenza markers : cinetosi -
vomito periodico - dolori agli
arti - turbe del sonno - dolo
ri addominali ricorrenti -
maschi n. _____ femmine n. _____

PAZIENTI CHE HANNO CONSULTATO UNO SPECIALISTA N. _____

otoiatra n. _____
oculista n. _____
algologo n. _____
neurologo n. _____
neurochirurgo n. _____

AI PAZIENTI CEFALALGICI E' STATO CONSIGLIATO VISITA NEUROLOGICA,
E.E.G., FUNDUS OCULARE, TAC di routine ? SI !__! NO !__!

TRA I PAZIENTI CEFALALGICI QUANTI SONO RIENTRATI IN UNO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE :

emicrania : - con aura maschi n. _____ femmine n. _____
- senza aura maschi n. _____ femmine n. _____
- attacchi ricorrenti : da 4 a 72 ore n. _____

emicrania complicata con disturbi neurologici durante le crisi n. _____
maschi n. _____ femmine n. _____

cefalea muscolo tensiva :
- episodiche : adulti maschi n. _____ femmine n. _____
infanzia maschi n. _____ femmine n. _____
- croniche : adulti maschi n. _____ femmine n. _____
infanzia maschi n. _____ femmine n. _____

cefalea a grappolo : maschi n. _____ femmine n. _____

- attacchi ricorrenti : quotidiani n. _____
in una settimana n. _____
in un mese n. _____

eventuali pazienti in trattamento con sali di litio n. _____

emicrania cronica parossistica : femmine n. _____ maschi n. _____

ipertensione e cefalea :

pazienti trattati con anti-ipertensivi n. _____
maschi n. _____ femmine n. _____

pazienti con cefalea cronica da abuso da Ergot-Derivati:

maschi n. _____ femmine n. _____

pazienti con crisi emicraniche a cui è seguito episodio Ictale :

maschi n. _____ femmine n. _____

emicrania ed epilessia :

maschi n. _____ femmine n. _____

emicrania indotta da cibi :

maschi n. _____ femmine n. _____

presenza di patologia da autointossicazione per abuso farmacologico :

maschi n. _____ femmine n. _____

LA TERAPIA E' SECONDO LA SUA ESPERIENZA COSTITUITA DA :

Monoterapia	SI ! <input type="checkbox"/> !	NO ! <input type="checkbox"/> !
Politerapia	SI ! <input type="checkbox"/> !	NO ! <input type="checkbox"/> !
Provvedimenti di tipo igienico-ambientale	SI ! <input type="checkbox"/> !	NO ! <input type="checkbox"/> !

IL MEDICO CURANTE
